


fourmidor[®]

Appât anti-fourmis extrêmement efficace pour la lutte contre les fourmillières.



BASF Pest Control Solutions

- Efficacité éprouvée et validée, à faible dose de fipronil
- Une formulation très appétant
- Une destruction rapide et complète des fourmillières
- Rapide et facile d'utilisation, à l'intérieur comme à l'extérieur

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.

 **BASF**

The Chemical Company

Fourmidor®

Efficacité démontrée du fipronil à faible dose

Fourmidor® porte la puissance insecticide et la fiabilité éprouvées du fipronil sur le marché professionnel européen de la lutte contre les fourmis.

Particulièrement efficace contre les fourmis noires (*Lasius niger*) ainsi que d'autres espèces de la sous-famille des *Formicinae*, il agit par contact et ingestion à très faible dose.

Une formulation en miellat irrésistible

Fourmidor® se présente sous la forme d'un miellat sucré, plutôt que d'un gel solide, une formulation issue des recherches et de l'expérience confirmant la capacité des appâts liquides glucidiques à attirer un nombre maximal de fourmis sur la période la plus longue.

La formulation est irrésistible pour les fourmis à la recherche de nourriture, qui ne peuvent déceler la matière active insecticide; de retour au nid, elles transfèrent rapidement le produit en nourrissant l'ensemble du couvain.

Une destruction rapide et complète des fourmilières

La concentration de 0,05 % de fipronil a été rigoureusement définie afin que les fourmis exposées à **Fourmidor®** aient suffisamment de temps pour partager largement le gel **Fourmidor®** appétent dans la colonie avant de succomber.


Les adultes, les larves et les reines meurent systématiquement dans le nid quelques heures après la consommation du produit, ce qui permet une élimination totale de la colonie.

Rapide et facile d'utilisation, à l'intérieur comme à l'extérieur

Fourmidor® est fourni en flacons compte-gouttes de 25ml ; la dose recommandée, à savoir une goutte de 0,03 g (3-4 mm de diamètre) tous les 30cm sur le trajet des fourmis, est appliquée rapidement et aisément.

Ce produit est indiqué à l'intérieur et autour des habitations et bâtiments commerciaux, et particulièrement efficace lorsqu'il est appliqué sur des surfaces non absorbantes le long des trajets et circuits des fourmis.

En extérieur, sur les terrasses et au pied des bâtiments, veiller à ce que le produit soit protégé de la pluie et des inondations. Une fois consommé, l'appât doit être remplacé au bout de 1 à 2 semaines si l'activité persistante des fourmis indique que la colonie est particulièrement importante ou s'est reformée à proximité.



Fourmidor® contient 0,05% de fipronil m/m.

Cette notice est donnée à titre de conseil.

Il faut soigneusement respecter les recommandations concernant l'utilisation qui sont indiquées pour chaque produit.

Fourmidor® est une marque déposée de BASF.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

BASF Agro SAS

Pest Control Solutions

21 chemin de la sauvegarde, 69134 ECULLY, France

Tél. : 04 72 32 45 45

www.pestcontrol.basf.fr

 **BASF**

The Chemical Company